

## 除草剤

## ゴエモン1キロ粒剤

イプフェンカルバゾン・イマゾスルフロン・プロモブチド粒剤

平成27年11月11日付けで以下の適用拡大が登録されました。

## 【変更内容】

- ・適用土壌および適用地帯を削除する。
- ・適用雑草名「ウリカワ(近畿・中国・四国を除く)」を「ウリカワ」に変更する。
- ・適用雑草名「ミズガヤツリ(北海道を除く)」を「ミズガヤツリ」に変更する。
- ・適用雑草名「ヘラオモダカ(東北)」を「ヘラオモダカ」に変更する。
- ・作物名「移植水稻」に適用雑草名「オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイ」を追加する。
- ・作物名「直播水稻」を追加する。

## 【変更後】

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法
移植水稻	水田一年生雑草 及び マツバイ ホトメ ウリカワ ミズガヤツリ ヘラオモダカ ヒルムシロ セリ オモダカ クログワイ コウキヤガラ シズイ	移植時	1kg /10a	1回	田植同時散布機 で施用
		移植直後～ ルビエ2.5葉期 ただし、 移植後30日 まで			湛水散布
直播水稻	水田一年生雑草 及び マツバイ ホトメ ウリカワ ミズガヤツリ ヒルムシロ セリ	稲1葉期～ ルビエ2葉期 ただし、収穫90 日前まで			

イプフェンカルバゾン を含む農薬の総使用回数	イマゾスルフロン を含む農薬の総使用回数	プロモブチド を含む農薬の総使用回数
2回以内	2回以内	2回以内

次頁へ続く

前頁より続く

#### 使用上の注意事項の変更

##### 【変更前】

- ・本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの2. 5葉期までに時期を失しないように使用すること。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にふれが出るので、必ず適期に使用するように注意すること。  
ホタルイは2葉期まで、ウリカワは2葉期（北海道、東北、北陸、関東・東山・東海は発生始期）まで、ミズガヤツリは2葉期まで、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生前から再生始期までが本剤の散布適期である。

##### 【変更後】

- ・本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの2. 5葉期までに時期を失しないように使用すること。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にふれが出るので、必ず適期に使用するように注意すること。  
ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリは2葉期まで、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生前から再生始期まで、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラは発生始期まで、シズイは草丈3 cmまでが本剤の散布適期である。
- ・「直播水稲で使用する場合、稲の根が露出する条件では薬害を生じるおそれがあるので注意すること。」を追加する。
- ・「オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイは発生期間が長く、遅い発生のものまでは十分な効果を示さない場合があるので、必要に応じて有効な後処理剤との組み合わせで使用すること。」を追加する。

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。