

除草剤

メガゼータフロアブル

ピラクロニル・プロピリスルフロロン水和剤

平成27年11月11日付けで以下の適用拡大が登録されました。

【変更内容】

- ・適用土壌および適用地帯を削除する。
- ・適用雑草名「ミズガヤツリ(北海道を除く)」を「ミズガヤツリ」に変更する。
- ・適用雑草名「ヘラオモダカ(北海道、東北)」を「ヘラオモダカ」に変更する。
- ・適用雑草名「エゾノサヤマカグサ(北海道)」を「エゾノサヤマカグサ」に変更する。
- ・適用雑草名「シズイ(東北、関東・東山・東海)」を「シズイ」に変更する。
- ・適用雑草名「クログワイ(北海道を除く)」を「クログワイ」に変更する。
- ・適用雑草名「コウキヤガラ(北海道、北陸を除く)」を「コウキヤガラ」に変更する。
- ・適用雑草名「アオミドロ・藻類による表層はく離(関東・東山・東海、近畿・中国・四国、九州)」を「アオミドロ・藻類による表層はく離」に変更する。
- ・作物名「直播水稻」を追加する。

【変更後】

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法
移植水稻	水田一年生雑草 及び マツバイ 杓刈 ウリカ ミズガヤツリ ヘラオモダカ ヒムシロ セリ エゾノサヤマカグサ シズイ オモダカ クログワイ コウキヤガラ アオミドロ・藻類による 表層はく離	移植後5日～ ルイ3葉期 ただし、 移植後30日まで	500 mL/10a	1回	原液湛水散布、 水口施用又は 無人ヘリコプター による滴下
直播水稻	水田一年生雑草 及び マツバイ 杓刈 ウリカ ミズガヤツリ ヒムシロ セリ	稲1葉期～ ルイ3葉期 ただし、 収穫60日前まで			原液湛水散布 又は無人ヘリコプター による滴下

ピラクロニル を含む農薬の総使用回数	プロピリスルフロロン を含む農薬の総使用回数
2回以内	2回以内

次頁へ続く

前頁より続く

使用上の注意事項の変更

【変更前】

- ・本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの3葉期までに、時期を失ないように散布すること。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にふれが出るので、必ず適期に散布するようにすること。ホタルイは3葉期（東北、北陸、関東・東山・東海は2葉期）まで、ウリカワは3葉期（北海道、関東・東山・東海、近畿・中国・四国は2葉期、東北、北陸は発生始期）まで、ヘラオモダカは3葉期まで、ミズガヤツリは3葉期（北陸、関東・東山・東海は2葉期）まで、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生前から再生始期まで、アオミドロ・藻類による表層はく離は発生前まで、エゾノサヤヌカグサは2葉期まで、シズイは草丈3cmまで、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラは発生始期までが本剤の散布適期である。
- ・本剤を無人ヘリコプターで滴下する場合は次の注意を守ること。
 - ・滴下は使用機種の使用基準に従って実施すること。
 - ・滴下に当たっては散布装置のノズルを使用しないこと。
 - ・作業中、薬液が漏れないように装置の十分な点検を行うこと。
 - ・隣接する圃場に水稻以外の作物が栽培されている場合は無人ヘリコプターによる本剤の滴下は行わないこと。
 - ・水源池、飲料水等に本剤が流入しないよう十分留意すること。
 - ・薬剤滴下に使用した装置は十分洗浄し、薬剤タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理すること。
 - ・本剤の滴下に使用した無人ヘリコプターの散布装置は、水稻以外の作物への薬剤散布には使用しないこと。

【変更後】

- ・本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの3葉期までに、時期を失ないように散布すること。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にふれが出るので、必ず適期に散布するようにすること。ホタルイ、ウリカワ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリは3葉期まで、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生前から再生始期まで、アオミドロ・藻類による表層はく離は発生前まで、エゾノサヤヌカグサは2葉期まで、シズイは草丈3cmまで、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラは発生始期までが本剤の散布適期である。
- ・本剤を無人ヘリコプターで滴下する場合は次の注意を守ること。
 - ・滴下は使用機種の使用基準に従って実施すること。
 - ・滴下に当たっては散布装置のノズルを使用しないこと。
 - ・作業中、薬液が漏れないように装置の十分な点検を行うこと。
 - ・隣接する圃場に水稻以外の作物が栽培されている場合は無人ヘリコプターによる本剤の滴下は行わないこと。
 - ・水源池、飲料水等に本剤が飛散、流入しないよう十分留意すること。
 - ・薬剤滴下に使用した装置は十分洗浄し、薬剤タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理すること。
 - ・本剤の滴下に使用した無人ヘリコプターの散布装置は、水稻以外の作物への薬剤散布には使用しないこと。
- ・「直播水稻で使用する場合、稲の根が露出する条件では薬害を生じるおそれがあるので注意すること。」を追加する。

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

住友化学株式会社