

## 殺虫殺菌剤

## スタウトダントツ箱粒剤08

クロチアニジン・イソチアニル粒剤

平成28年12月14日付けで以下の適用拡大が登録されました。

## 【変更内容】

- ・作物名「稲（箱育苗）」の適用病害虫名「苗立枯細菌病」に使用時期「は種前」、使用方法「育苗箱の床土に均一に混和する。」を追加する。

## 【変更後】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	加チアニジンを含む農薬の総使用回数	イソチアニルを含む農薬の総使用回数
稲 (箱育苗)	いもち病 白葉枯病 もみ枯細菌病 穂枯れ (ごま葉枯病菌) 内穎褐変病 イヌシヅウムシ イトメイシ ウカ類 ツマグロコバエ	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1箱当り50g	は種前	1回	育苗箱の床土 又は覆土に 均一に混和する。	4回以内 (移植時までの処理は 1回以内、 本田での 散布、 空中散布、 無人機散布 は合計3回 以内)	3回以内 (移植時までの処理は 1回以内、 本田では 2回以内)
	イビキハダガリバエ		は種時 (覆土前) ～移植当日		育苗箱の上から 均一に散布する。		
	苗立枯細菌病		移植3日前 ～移植当日		育苗箱の床土に 均一に混和する。		
	苗腐敗症 (もみ枯細菌病菌)		は種前		育苗箱の床土 又は覆土に 均一に混和する。		
	苗立枯細菌病 苗腐敗症 (もみ枯細菌病菌)		は種時 (覆土前)		育苗箱の上から 均一に散布する。		

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

住友化学株式会社