

農林水産省登録
第23745号

除草剤

ゴエモンジャンボ

イプフェンカルバゾン・イマゾスルフロン・ブロモブチド粒剤

平成29年8月30日付けで以下の適用拡大が登録されました。

【変更内容】

- ・作物名「移植水稻」に適用雑草名「シズイ」を追加する。

【変更後】

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	イプフェンカルバゾンを含む農薬の総使用回数	イマゾスルフロンを含む農薬の総使用回数	ブロモブチドを含む農薬の総使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 及び マツバ オシロイ ヘオモダ ミズガヤリ オモダ クダマ コキヤウ シズイ ウリカ ヒムロ セリ アミドロ・藻類による 表層はく離	移植直後～ バエ2.5葉期 ただし、 移植後30日 まで	小包装 (パック) 10個 (300g) /10a	1回	水田に 小包装 (パック) のまま 投げ 入れる	2回以内	2回以内	2回以内
直播水稻	水田一年生雑草 及び マツバ オシロイ ミズガヤリ ウリカ ヒムロ セリ アミドロ・藻類による 表層はく離	稲1葉期～ バエ2.5葉期 ただし、 収穫90日前 まで						

次頁へ続く

前頁より続く

使用上の注意事項の変更

【変更前】

- ・本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの2. 5葉期までに時期を失しないように使用すること。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にふれが出るので、必ず適期に使用するよう注意すること。ホタルイ、ミズガヤツリは3葉期まで、ウリカワ、ヘラオモダカは2葉期まで、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生前から再生始期まで、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラは発生始期まで、アオミドロ・藻類による表層はく離は発生前までが本剤の使用適期である。
- ・オモダカ、クログワイ、コウキヤガラは発生期間が長く、遅い発生のものまでは十分な効果を示さない場合があるので、必要に応じて有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

【変更後】

- ・本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの2. 5葉期までに時期を失しないように使用すること。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にふれが出るので、必ず適期に使用するよう注意すること。ホタルイ、ミズガヤツリは3葉期まで、ウリカワ、ヘラオモダカは2葉期まで、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生前から再生始期まで、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラは発生始期まで、シズイは草丈3cmまで、アオミドロ・藻類による表層はく離は発生前までが本剤の使用適期である。
- ・オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイは発生期間が長く、遅い発生のものまでは十分な効果を示さない場合があるので、必要に応じて有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

住友化学株式会社