

## 殺菌剤

## STダコニール1000

## TPN水和剤

平成29年12月6日付けで以下の適用拡大が登録されました。

## 【追加事項】

- ・作物名に「ごぼう」を追加する。
- ・作物名「ねぎ」の適用病害虫名「苗立枯病（リゾクトニア菌）」の使用用量に「セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊（30×60cm、使用土壌約5L）当り0.5L」を追加する。
- ・作物名「しゃくやく（薬用）」の「本剤の使用回数」および「TPNを含む農薬の総使用回数」を「3回以内」から「15回以内（1年間に3回以内）」にする。

## 【変更部分】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	TPNを含む農薬の総使用回数
ごぼう	うどんこ病	1000倍	100~300L /10a	収穫前日まで	5回以内	散布	5回以内
しゃくやく（薬用）	うどんこ病	1000倍	100~300L /10a	収穫45日前まで	15回以内 （1年間に3回以内）	散布	15回以内（1年間に3回以内）

## 土壌灌注として使う場合

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	TPNを含む農薬の総使用回数
ねぎ	苗立枯病 （リゾクトニア菌）	500倍	0.5L/m <sup>2</sup> セル成型育苗 トレイ1箱ま たはペーパー ポット1冊 （30× 60cm、使用 土壌約5L） 当り0.5L	出芽揃い後 （出芽3日後から 10日後まで）	1回	土壌 灌注	4回以内（土壌 灌注は1回以 内、散布は3 回以内）

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

住友化学株式会社