



Dow AgroSciences

平成 30 年 9 月吉日

お客様各位

ダウ・アグロサイエンス日本株式会社
取締役マーケティング本部長 藤井 茂樹

「トランسفォーム™フロアブル」「エクシード™フロアブル」適用拡大認可のご案内

拝啓 秋冷の候、皆様方におかれましては益々ご隆盛のこととお慶び申し上げます。平素は格別なるご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、園芸用殺虫剤「トランسفォームフロアブル」と水稻用殺虫剤「エクシードフロアブル」の適用拡大申請が別紙のとおり、9月26日付にて認可となりましたのでご案内申し上げます。

今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

(別紙-1)

薬剤名：トランスフォームフロアブル

農林水産省登録 第24016号 トランスフォームフロアブル

以下の内容が適用拡大となりました。

- ・作物名に「すもも」、「とうとう」、「ぶどう」、「はくさい」、「非結球レタス」、「なす」、「ピーマン」、「きく」を追加する。
- ・「かんきつ」に適用病害虫名「ゴマダラカリ成虫」を「キャベツ」に適用病害虫名「ズアザミヤマ」を追加する。

作物名	適用 病害虫名	希釀 倍数	使用液量	使用時 期	本剤の 使用回 数	使用 方法	スルホキ サフル を含む農 薬の総使 用回数
りんご	アブラムシ類	2000～ 4000倍	200～ 700L/10a	収穫前 日まで	3回以 内	散布	3回以内
	リンゴワタシ	1000～ 2000倍					
	カイガラムシ類	2000倍					
なし	アブラムシ類	2000～ 4000倍					
	カイガラムシ類	1000～ 2000倍					
かんきつ	アブラムシ類	2000倍	200～ 700L/10a	収穫 3日前ま で	3回以 内	散布	3回以内
	カイガラムシ類	1000～ 2000倍					
	ゴマダラカリ 成虫	2000倍					
すもも	アブラムシ類	2000倍		収穫 7日前ま で			
	カイガラムシ類	1000～ 2000倍					
とうとう	カイガラムシ類	1000～ 2000倍					
ぶどう	カイガラムシ類	1000～ 2000倍		収穫 14 目前で			

(別紙-2)

作物名	適用 病害虫名	希釗 倍数	使用液量	使用 時期	本剤の 使用回 数	使用 方法	スルホキ サフルル を含む農 薬の総使 用回数
キャベツ	アブラムシ類	2000 倍	100～ 300L/10a	収穫前 日まで	3 回以内	散布	3 回以内
	オジアザミヤマ						
だいこん							
レタス	収穫 3 日前 まで						
非結球レタス	アブラムシ類						
はくさい							
きゅうり	アブラムシ類	2000 倍	2 回以内	収穫前 日まで	3 回以内	散布	2 回以内
	コナガラミ類	1000～ 2000 倍					
なす	ア布拉ムシ類	2000 倍					
	コナガラミ類	1000～ 2000 倍					
ピーマン	ア布拉ムシ類	2000 倍	3 回以内	発生 初期	3 回以内	散布	3 回以内
	コナガラミ類	1000～ 2000 倍					
トマト ミニトマト	ア布拉ムシ類	2000 倍					
	コナガラミ類	1000～ 2000 倍					
きく	ア布拉ムシ類	2000 倍					
	アザミヤマ類	1000～ 2000 倍					

(別紙-3)

薬剤名：エクシードフロアブル

農林水産省登録 第24019号 エクシードフロアブル

以下の内容が適用拡大となりました。

- ・作物名「水田作物、畑作物（休耕田）」を追加する。
- ・作物名「稻」に希釀倍数「500 倍」、使用液量「25L/10a」を追加する。また、「稻」に希釀倍数「16 倍」、使用液量「0.8L/10a」、使用方法「無人航空機による散布」を追加する。

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釀倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	スルホキサフルを含む農薬の総使用回数	
稻	-	ウツカ類 ツマグロヨコバイ カムシ類	2000 倍	60～ 150L /10a	収穫 7 日前まで	3 回以内	散布	3 回以内	
			500 倍	25L/ 10a			無人航空機 による散布		
			16 倍	0.8L /10a					
水田作物、畑作物（休耕田）	ヨシ、オギ、 ススキ、セイタ アワダチソウ等 の多年生 雑草が優占して いる休耕田	カムシ類	2000 倍	60～ 150L /10a	—	—	散布	—	

以 上